

## Protocoles Opérationnels Standardisés Thérapeutiques et Exploratoires

### FICHE P.O.S.T.E — DIVERS / IATROGÉNIE · PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE

Réf. POSTE-DIV-01 · Version 1.0 — validée le 21/06/2026

# ALLERGIE AUX PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS

## Objet

Prévenir et prendre en charge une réaction aux produits de contraste iodés.

## CAT diagnostique


### 1. Mise au point & clinique

- L'« allergie à l'iode » est un abus de langage : la réaction concerne le produit de contraste, non l'iode élémentaire.
- Préciser l'antécédent : type de réaction (immédiate/retardée), gravité, produit en cause.

### 2. Évaluation paraclinique

Évaluer la fonction rénale (néphrotoxicité) ; bilan allergologique à distance si réaction sévère documentée.

## Algorithme décisionnel



## CAT thérapeutique

Antécédent de réaction : indication réévaluée, alternative d'imagerie (échographie), autre produit, prémédication selon protocole, surveillance rapprochée. Réaction aiguë : arrêt de l'injection ; selon la gravité — antihistaminiques, corticoïdes ; adrénaline et réanimation si anaphylaxie.

## Surveillance

- Surveillance pendant et après l'injection ; fonction rénale après contraste.

## Points de vigilance

- Chariot d'urgence (adrénaline) indispensable ; reconnaître précocement l'anaphylaxie.

## Adaptation à notre contexte (ressources limitées)

- Privilégier une imagerie alternative (échographie) chez les patients à risque quand c'est pertinent.
- Chariot d'urgence avec adrénaline : indispensable et peu coûteux ; reconnaître précocement l'anaphylaxie.