

Protocoles Opérationnels Standardisés Thérapeutiques et Exploratoires

FICHE P.O.S.T.E — DIABÈTE — DIAGNOSTIC, COMPLICATIONS & SUIVI · PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE

Réf. POSTE-DIAB-03 · Version 1.0 — validée le 21/06/2026

CÉTOSE RÉVÉLANT UN DIABÈTE INAUGURAL

CAT diagnostique


1. Signes cliniques

- Syndrome cardinal récent, amaigrissement ; évaluer la gravité (déshydratation, conscience, polypnée).
- Souvent sujet jeune (DT1) mais possible à tout âge.

2. Signes paracliniques

Glycémie veineuse (confirmer le diabète), cétonémie, gaz du sang, iono ; bilan initial ; selon contexte, auto-anticorps pour typer le diabète.

Algorithme décisionnel



CAT thérapeutique

Mise sous insuline d'emblée ; hydratation ; éducation initiale (autosurveillance, signes d'alerte, technique d'injection) ; caractérisation ultérieure du type de diabète.

Surveillance

- Glycémie, cétonémie, kaliémie, conscience ; éducation progressive.

Points de vigilance

- Ne pas retarder l'insuline ; organiser l'éducation et le suivi.

Adaptation à notre contexte (ressources limitées)

- Mise sous insuline humaine d'emblée ; éducation initiale avec supports visuels.
- Caractérisation du diabète (auto-anticorps) différée si non disponible — ne pas retarder le traitement.