

Protocoles Opérationnels Standardisés Thérapeutiques et Exploratoires

FICHE P.O.S.T.E — DIABÈTE — DÉCOMPENSATIONS AIGÜES · PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE

Réf. POSTE-DIAB-04 · Version 1.0 — validée le
21/06/2026

CÉTOSE CHEZ LE PATIENT INSULINOTRAITÉ

CAT diagnostique


1. Signes cliniques

- Rechercher : omission/insuffisance d'insuline, dysfonction de pompe/stylo, infection.
- Évaluer la tolérance (digestive, conscience).

2. Signes paracliniques

Glycémie, cétonémie ; vérifier le matériel d'injection ; gaz du sang si signes de gravité ; bilan d'un facteur déclenchant.

Algorithme décisionnel



CAT thérapeutique

Ne jamais arrêter l'insuline (maintenir la basale) ; suppléments d'insuline rapide selon glycémie/cétonémie ; hydratation ; vérifier/corriger le matériel d'injection ; traiter le facteur déclenchant.

Surveillance

- Glycémie/cétonémie rapprochées ; tolérance ; éducation.

Points de vigilance

- Règles des « jours de maladie » : basale maintenue, hydratation, surveillance de la cétonémie.

Adaptation à notre contexte (ressources limitées)

- Vérifier le matériel d'injection (stylo/seringue) ; insuline humaine.
- Renforcer l'éducation aux « jours de maladie » avec un proche aidant.