

Protocoles Opérationnels Standardisés Thérapeutiques et Exploratoires

FICHE P.O.S.T.E — CARDIOLOGIE & MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE · PROTOCOLE EXPLORATOIRE

Réf. POSTE-CARD-07 · Version 1.0 — validée le
21/06/2026

HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE DROITE

Objet

Reconnaître une hypertrophie ventriculaire droite (HVD) à l'ECG et l'orienter.

CAT diagnostique


1. Contexte clinique

- Dyspnée, signes d'insuffisance cardiaque droite ; terrain (BPCO, HTAP, valvulopathie, cardiopathie congénitale).

2. Signes ECG

- Déviation axiale droite ; grande onde R en V1 ($R/S > 1$) ; ondes S persistantes en précordiales gauches.
- Troubles de repolarisation droite ; hypertrophie auriculaire droite (P pulmonaire).

Algorithme décisionnel



CAT thérapeutique / conduite

Corréler à la clinique et à l'échocardiographie ; rechercher et traiter la cause (BPCO, embolie pulmonaire chronique, HTAP, valvulopathie).

Points de vigilance

- L'ECG oriente mais l'échocardiographie confirme.

Adaptation à notre contexte (ressources limitées)

- ECG + échographie selon disponibilité ; orienter et traiter la cause (cœur pulmonaire fréquent).